	Plate.	Fig.	Page.
Mordella leucographa *	XII.	5	279, 462
—— fluctuosa	XII.	6	280
—— acuticauda	XII.	7	280
—— octolineata	XII.	8	281
—— subdola	XII.	9	282
—— chevrolati, ♂	XII.	10	283
—— sexnotata	XII.	11	283
—— dimidiata	XII.	12	284
—— rufomaculata	XII.	13	285
—— crassipes	XII.	14	285
—— rufovittata	XII.	15	286
—— badiipennis	XII.	16	286
—— flavolineata	XII.	17	287
—— flavofasciata	XII.	18	287
—— flavonotata	XII.	19	288
—— nigromaculata	XII.	20	289
—— lineatipyga	XII.	21	289
—— univittata	XII.	22	290
—— pustulosa	XII.	23–25	291
—— septemnotata, ♀	XII.	26	292
—— mexicana, ♂	XII.	27	292
—— leucogramma, ♀	XIII.	1	293
—— cingulata, ♂	XIII.	2	294
—— biformis, ♂	XIII.	3	295
—— ——, ♀	XIII.	4	295
—— rutilicollis, ♀	XIII.	5	296
—— erythrocephala	XIII.	6	296
—— teapensis	XIII.	7	297
—— flavifrons	XIII.	8	297
—— seriata	XIII.	9	298
—— apicicornis, ♂	XIII.	10	299
—— xanthosticta	XIII.	11	299
—— sticticoptera	XIII.	12	300
—— varicornis	XIII.	13	300
—— panamensis	XIII.	14	301
—— T-album	XIII.	15	301
—— pretiosa	XIII.	16	302
—— tenuipes	XIII.	17	303
—— fenestrata, ♂	XIII.	18	304
Glipodes sericans, ♂	XIII.	19	305
Conalia ebenina	XIII.	20	306
Calyce fulva	XIII.	21	307
Mordellistena ephippiata, ♂	XIII.	22	310
—— lineatocollis, ♀	XIII.	23	311
—— ——, ♂ (details)	XIII.	24	311
—— æquinoctialis, ♂	XIII.	25	311
—— ——, ♀ (details)	XIII.	26	311
—— valens, ♀	XIII.	27	312
—— castaneicolor, ♀	XIV.	1	313
—— isthmica	XIV.	2	315
—— sexmaculata, ♂	XIV.	3	316
—— ——, ♀, var.	XIV.	4	316
Mordellistena crassipyga	XIV.	5	317
—— forticornis, ♂	XIV.	6	317
—— rufonotata, ♂	XIV.	7	318
—— gracilicornis, ♂	XIV.	8	318
—— opalescenticeps, ♂	XIV.	9	319
—— sanguinicollis, ♂	XIV.	10	320
—— trilinea	XIV.	11	320
—— hexastigma, ♂	XIV.	12	321
—— venusta	XIV.	13	322
—— pictipennis, ♂	XIV.	14	322
—— guttifer, ♂	XIV.	15	323
—— crassipalpis, ♂	XIV.	16	324
—— instabilis, ♂	XIV.	17	324
—— ——, ♂, var.	XIV.	18	324
—— tenuipalpis, ♂ †	XIV.	19	326, 462
—— discicollis, ♂	XIV.	20	327
—— atripennis	XIV.	21	327
—— nigriceps, ♂	XIV.	22	328
—— cinereonotata, ♀	XIV.	23	329
—— luteifrons, ♂, var.	XIV.	24	330
—— laticollis	XIV.	25	331
—— brunneipilis, ♂	XV.	1	332
—— rubricollis, ♂	XV.	2	334
—— azteca, ♂	XV.	3	334
—— sparsa, ♂	XV.	4	335
—— tessellata, ♂	XV.	5	336
—— quadrifasciata	XV.	6	337
—— diluta	XV.	7	338
—— orizabensis, ♂	XV.	8	338
—— mutabilis, ♀	XV.	9	339
—— ——, ♂, var.	XV.	10	339
—— ——, ♀, var.	XV.	11	339
—— isabellina	XV.	12	340
—— basimacula	XV.	13	341
—— filicornis, ♂	XV.	14	342
—— flavicornis	XV.	15	342
—— distorta, ♂	XV.	16	343
—— curvimana, ♂	XV.	17	344
—— xanthopyga, ♀	XV.	18	344, 462
—— nigerrima	XV.	19	345
—— annulipyga, ♂	XV.	20	345
—— crux	XV.	21	346
—— beata, ♂	XV.	22	347
—— minutissima, ♂	XV.	23	348
—— palpalis, ♂	XV.	24	348
—— fasciculata	XV.	25	349
—— festiva, ♂	XV.	26	350
Rhipidophoridæ.			
Pelecotomoides nubila, ♂	XVI.	1	351
—— ——, ♀	XVI.	2	351
—— lineata, ♀	XVI.	3	351

* *Mordella leucosticta* on the Plate.

† *Mordellistena longipalpis* on the Plate.