

### 1. *Platythyrea cineracea*.

*Platythyrea cineracea*, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. xxx. p. xxxix (♂) (1886)<sup>1</sup>; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 42 (♂) (1890)<sup>2</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 27<sup>3</sup>.

*Hab.* COSTA RICA, Liberia (*Alfaro*<sup>2</sup>); GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll*<sup>1</sup>).

À la description de cette espèce il faut ajouter que les dents du métanotum sont plus étroites que chez la *P. pruinosa* (*P. punctata* ?), mais plus distinctes et un peu recourbées en avant.

Un ♂, long de 5·9 millim., aux ailes entièrement hyalines et avec le métanotum, le pétiole et la base de l'abdomen fortement rugueux (fossettes longitudinales sinueuses), récolté à Atoyac, Vera Cruz, Mexique, par M. H. H. Smith en mai, et un autre presque semblable, mais un peu plus grande et aux ailes subhyalines, récolté en avril au même endroit me paraissent se rapporter à cette espèce. Mais c'est avec doute; le métanotum est bordé d'élévations lamelleuses.

### 2. *Platythyrea inconspicua*.

*Platythyrea inconspicua*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. p. 961 (♀) (1870)<sup>1</sup>; Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 56 (♂)<sup>2</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 27<sup>3</sup>.

*Hab.* PANAMA<sup>2</sup>.—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Cayenne<sup>2 3</sup>, Amazones<sup>2</sup>.

### 3. *Platythyrea pruinosa*.

*Platythyrea pruinosa*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. p. 962 (♂) (1870)<sup>1</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 27<sup>2</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>1 2</sup>; GUATÉMALA, Torola (*Champion*) [♂].

Un mâle récolté à Bugaba, Panama, par M. Champion me paraît devoir se rapporter à cette espèce. Il est très voisin de celui de la *P. punctata*, mais un peu plus grand. Les ailes sont enfumées.

Je soupçonne fortement que la *P. pruinosa*, Mayr, est synonyme de la *P. punctata*, Smith, des Antilles.

## CYLINDROMYRMEX.

*Cylindromyrmex*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. p. 967 (1870).

*Holcoponera*, Cameron, Whympers's Great Andes, Suppl. Append. p. 92 (1891) (nec Mayr).

### 1. *Cylindromyrmex godmani*, sp. n. (Tab. I. figg. 2, 2 a-c, ♀.)

♀. Long. 12·5 millim. Mandibules lisses, luisantes, avec quelques stries latérales et terminales et trois ou quatre dents obtuses, irrégulières à leur bord terminal. Epistome subvertical, sans carène, avec une impression médiane. Les arêtes frontales presque parallèles, très élevées, proéminent chacune en avant, en lobe arrondi, laissant entre elles deux, au milieu, une profonde et large échancrure. Elles se prolongent en arrière, par une strie élevée, jusqu'à l'occiput. La tête est une fois et demie plus longue que large, rectangulaire, échancrée derrière, avec les côtés faiblement concaves au milieu. Les scapes sont très courts, fortement atténués à leur base, et renflés sur leurs  $\frac{2}{3}$  terminaux en forme de large massue, presque aussi large que longue et trois fois plus épaisse que la base. Les articles 2 à 6 des funicules sont