

Ectatomma tuberculatum, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 102 (♂), t. 7. figg. 10-13 (1858)⁴; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xii. p. 732⁵; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 40 (1890)⁶; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 26⁷.

Ponera (Ectatomma) tuberculata, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1860, p. 306⁸.

Formica tridentata, Fabr. Syst. Piez. p. 42 (♀) (1804)⁹.

Ectatomma ferrugineum, Norton, Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 5 (♂) fig. (1868)¹⁰; Amer. Nat. ii. p. 61, t. 2. fig. 4¹¹.

Hab. MEXIQUE^{7 10 11}, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*), Temax et Valladolid en Yucatan (*Gaumer*); GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll*), Teleman et Lanquin en Vera Paz, Paraiso (*Champion*); COSTA RICA, Jiménez, Pozo Azul (*Alfaro*⁶); PANAMA, Bugaba, Caldera, David (*Champion*) [♀ ♀].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE^{4 8}, jusqu'à Brésil⁴ et Pérou⁷.

Vit en Colombie dans les forêts de la "tierra caliente," où on la prend surtout sur le feuillage au contraire de l'espèce suivante (*Forel*).

Commun sur les savanes de la "tierra caliente" en Chiriqui (*Champion*).

2. *Ectatomma ruidum*. (Tab. I. figg. 3, 3 a, ♀.)

Ponera (Ectatomma) ruida, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1860, p. 306 (♀) ¹.

Ectatomma ruidum, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1862, p. 732²; xxxvii. p. 539³; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 14 (1890)⁴; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 26⁵.

Ectatomma scabrosa, Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) i. p. 31 (♀) (1862)⁶; Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1862, p. 292⁷.

Hab. MEXIQUE, Dos Arroyos en Guerrero, Vera Cruz (*H. H. Smith*); NICARAGUA, Chontales (*Janson*); COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*⁴) et Buenos Aires (*Pittier*) [♀ ♀ ♂] (*Tonduz*); PANAMA (*Stretch*⁶), Caldera, David, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♀].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Colombie¹, Cayenne¹, Brésil¹.

J'ai observé cette espèce qui est très commune en Colombie. Elle mine son nid dans la terre, sans faire le moindre dôme ni cratère. Les ouvertures sont étroites, à ras de terre et difficiles à trouver. Les fourmilières ne paraissent pas être très peuplées, mais il y en a beaucoup, surtout dans les forêts, les clairières et dans les terrains cultivés, ainsi que dans les buissons.

3. *Ectatomma bispinosum*.

Ectatomma (Holcopenera?) bispinosum, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 40 (♀) (1890)¹; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 23².

Ectatomma (subgen. *Ectatomma*, sens. strict.) *bispinosum*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 5 (1896)³.

Hab. COSTA RICA^{2 3}, Jiménez (*Alfaro*¹).