

Sous-gen. HOLCOPONERA.

Les espèces de ce sous-genre vivent dans le bois pourri ou sous les pierres.

4. **Ectatomma (Holcoponera) strigatum.**

Ponera strigata, Norton, Amer. Naturalist, ii. p. 61 (1868) (sine descr.)¹.

Polyrhachis strigata, Norton, Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 4 (♂) (1868)².

Ectatomma (Holcoponera) strigata, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxiii. p. 167 (1891)³.

Gnamptogenys concentrica, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1870, p. 963 (♂)⁴.

Ectatomma (Holcoponera) concentricum, Mayr, op. cit. xvii. p. 540 (1887)⁵.

Hab. MEXIQUE¹⁻⁵ (*Norton, Bilimek*).

5. **Ectatomma (Holcoponera) curtulum.**

Ectatomma (Holcoponera) curtulum, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 15 (♂) (1896)¹.

♀. Long. 5.1 millim. Un peu plus foncée que l'ouvrière. Du reste mêmes caractères. Ailes enfumées de brunâtre.

Hab. GUATÉMALA, environs de la Ville (*Champion*) [♂]; NICARAGUA, Chontales (*Janson*) [♂ ♀]; COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*) [♂].

Var. *stolli*, n.

♂. Diffère de la forme typique par sa tête un peu plus rétrécie à l'occiput, où elle est un peu plus étroite, et par l'absence d'impression transversale distincte sur le métanotum. Couleur d'un brun plus foncé.

♂. Long. 4 millim. Tibias d'un brun jaunâtre (d'un brun foncé chez l'*E. striatulum*). Plus petit et plus grêle que celui de l'*E. striatulum*. Du reste à peine distinct. Ailes enfumées de brun.

Hab. GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll*).

6. **Ectatomma (Holcoponera) simplex.**

Ectatomma (Holcoponera) simplex, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 14 (♂ ♀) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*), Alajuela (*Alfaro*¹).

7. **Ectatomma (Holcoponera) porcatum.**

Ectatomma (Holcoponera) porcatum, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxviii. p. 15 (♂) (1896)¹.

Hab. COSTA RICA, Alajuela (*Alfaro*¹).

Sous-gen. GNAMPTOGENYS, Roger.

8. **Ectatomma (Gnamptogenys) concinnum.** (Tab. I. fig. 4, ♂.)

Ectatomma concinna, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 103 (♀) (1858)¹.

Gnamptogenys concinna, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xvi. p. 892, t. 20. fig. 5 (♂) (1866)²; xx. p. 963³; xxvii. p. 541⁴; xxxvi. p. 358⁵; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 23⁶.

Ectatomma (Gnamptogenys) concinnum, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 41 (♂) (1890)⁷.

Hab. COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*⁷); PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♂].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Brésil^{1 6}, Pérou⁶.