

9. **Ectatomma (Gnamptogenys) annulatum.** (Tab. I. figg. 5, 5 a, ♀.)

*Ectatomma rimulosum* (Roger), var. *annulatum*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. p. 543 (♂ ♂) (1887)<sup>1</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 26<sup>2</sup>.

*Ectatomma (Gnamptogenys) annulatum*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 41 (♀ ♀) (1890)<sup>3</sup>; xxviii. p. 20 (1896)<sup>4</sup>.

*Hab.* COSTA RICA, Alajuela, Jiménez (*Alfaro*<sup>3</sup>); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♀ ♀].—BRÉSIL<sup>1 2</sup>.

10. **Ectatomma (Gnamptogenys) sulcatum.** (Tab. I. figg. 6, 6 a, ♂ ; 7, ♀ ; 8, 8 a, ♂.)

*Ponera sulcata*, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 99 (♂) (1858)<sup>1</sup>.

*Gnamptogenys sulcata*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. p. 358<sup>2</sup>.

*Ectatomma sulcatum*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 26<sup>3</sup>.

♀. Long. 6.5 millim. Ailes enfumées de brun. Du reste comme l'ouvrière. Stries du métanotum longitudinales, comme partout ailleurs.

♂. Long. 5.5 millim. Sculpture plus fine, mais du reste comme chez l'♀ ; couleur plus terne. Mandibules triangulaires, brunes, à bord terminal denté. Tête, abdomen, pédicule, métapleures, scutellum, funicules et pattes, sauf les cuisses antérieures, bruns. Le reste du thorax, les cuisses antérieures, les scapes et le premier article des funicules d'un jaune rougeâtre moins brillant que chez la ♀ et l'♂ ; les deux faces du métanotum subégales, la déclive obliquement tronquée.

*Hab.* COSTA RICA, Alajuela, Jiménez (*Alfaro*<sup>3</sup>); PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♀ ♀].

11. **Ectatomma (Gnamptogenys) tornatum.** (Tab. I. figg. 9, 9 a, ♀.)

*Ponera tornata*, Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1861, p. 15 (♀ ♀ ♂)<sup>1</sup>.

*Gnamptogenys tornata*, Roger, op. cit. 1863, p. 174<sup>2</sup>; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. p. 964<sup>3</sup>.

*Ectatomma tornatum*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 26<sup>4</sup>.

*Hab.* MEXIQUE, Vera Cruz<sup>1 4</sup>, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*) [♂], Orizaba (*aussure*); GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll*) [♂ ♂], Pantaleon (*Champion*).

12. **Ectatomma (Gnamptogenys) splendidum.**

*Ectatomma (Gnamptogenys) rimulosum*, Roger, var. *splendidum*, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) v. p. 871 (♀) (1895)<sup>1</sup>.

*Hab.* MEXIQUE, Tepic (*Eisen & Vaslit*<sup>1</sup>).

Ce n'est point du tout une variété de l'*E. rimulosum*, comme l'écrit M. Pergande. Cette espèce est très rapprochée de l'*E. continuum*, Mayr (sec. ex type).

13. **Ectatomma (Gnamptogenys) regulare.**

*Gnamptogenys regularis*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xx. pp. 963, 964 (♀ ♀) (1870)<sup>1</sup>.

*Ectatomma (Gnamptogenys) regulare*, Mayr, op. cit. xxxvii. p. 541 (1887)<sup>2</sup>.

*Ectatomma regulare*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 26<sup>3</sup>.

*Hab.* MEXIQUE<sup>1 2 3</sup>; PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♂].