

**14. Ectatomma (Gnamptogenys) mordax.**

*Ponera mordax*, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 98 (♀ ♂) (1858)<sup>1</sup>.

*Ectatomma (Gnamptogenys) mordax*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 9 (1894)<sup>2</sup>; xxviii. p. 17 (1896)<sup>3</sup>.

*Hab.* COSTA RICA (*Alfaro*<sup>1 2 3</sup>).—BRÉSIL.

**15. Ectatomma (Gnamptogenys) alfaroi.**

*Ectatomma (Gnamptogenys) alfaroi*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 145 (♀) (1894)<sup>1</sup>.

*Hab.* COSTA RICA, Jiménez (*Alfaro*<sup>1</sup>).

**16. Ectatomma (Gnamptogenys) rastratum.**

*Ectatomma rastratum*, Mayr, Ver. zool.-bot. Ges. Wien, xvi. p. 890 (♀) (1866)<sup>1</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 25<sup>2</sup>.

*Ectatomma (Rhytidoponera?) rastratum*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. p. 539<sup>3</sup>.

*Ectatomma (Gnamptogenys) rastratum*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 41<sup>4</sup>.

*Hab.* COSTA RICA<sup>2</sup>, Alajuela (*Alfaro*<sup>4</sup>).—BRÉSIL<sup>2</sup>.

Sous-gen. ACANTHOPONERA.

**17. Ectatomma (Acanthoponera) dentinode.**

*Ectatomma (Acanthoponera) dentinode*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. p. 541 (♀ ♀ ♂) (1887)<sup>1</sup>; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxvi. p. 143<sup>2</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 24<sup>3</sup>.

*Hab.* BOLIVIE<sup>2</sup>; BRÉSIL<sup>1 3</sup>.

Var. *panamense*, n.

C'est une variété à sculpture plus dense, à pubescence plus abondante et à couleur d'un brun plus foncé.

*Hab.* PANAMA, Volcan de Chiriqui 3000' (*Champion*) [♀].

**18. Ectatomma (Acanthoponera) mucronatum.**

*Ponera mucronata*, Roger, Berl. ent. Zeitschr. iv. p. 299 (♀) (1860)<sup>1</sup>.

*Ectatomma (Acanthoponera) mucronatum*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xii. p. 733 (♀) (1862)<sup>2</sup>.

*Hab.* BRÉSIL<sup>1 2</sup>.

Var. *minor*, n.

♀. Long. 5·3 millim. Épine de l'écaillle un peu plus relevée, formant moins d'angle avec l'écaillle. Taille plus petite.

*Hab.* MEXIQUE, Teapa en Tabasco (*H. H. Smith*) [♀].