

PARAPONERA.

Paraponera, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 100, t. 7 (1858); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 18.

1. *Paraponera clavata*.

Formica clavata, Fabr. Syst. Ent. p. 394 (♂) (1775)¹.

Ponera clavata, Lepel. Hist. Nat. Ins. Hymén. i. p. 188 (♀) (1836)².

Paraponera clavata, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 100 (♂), t. 7. fig. 6 (1858)³; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 42 (♂ ♀) (1890)⁴; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 18⁵.

Formica aculeata, Oliv. Encycl. Méthod. Ins. vi. p. 498 (♀) (1791)⁶.

Ponera aculeata, Lepel. Encycl. Méthod. Ins. x. p. 184 (♀)⁷.

Formica spininoda, Latr. Hist. Nat. des Fourmis, p. 207 (♂ ♀), t. 7. fig. 45 (1802)⁸.

Ponera tarsalis, Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. p. 135, t. 27. fig. 2 (♀) (1833)⁹.

Hab. NICARAGUA, Chontales (*Janson*); COSTA RICA, Jiménez, Sarapiquí (*Alfaro*⁴).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, jusqu'à Paraguay.

PACHYCONDYLA.

Pachycondyla, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 105, t. 7 (1858); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 32.

1. *Pachycondyla ænescens*.

Pachycondyla ænescens, Mayr, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, lxi. pp. 396, 397 (♂) (1870)¹; Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 72²; Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 42 (♀) (1890)³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 32⁴.

♂. Long. 9 à 10 millim. Grêle. Épistome avec une impression médiane devant. Yeux relativement petits. Tête convexe derrière. Scape plus long qu'épais. Face basale du métanotum plus longue que la face déclive. Cette dernière obliquement tronquée et grossièrement ridée en travers. Nœud du pédicule en cône arrondi et élevé, beaucoup plus haut qu'épais à la base. Abdomen allongé. Pygidium en pointe longue et aiguë. Hypopygium en lamelle allongée, acuminée, assez plate. Valvules génitales extérieures grandes, arrondies à l'extrémité.

Subopaque, finement ponctué; métanotum avec des rides et rugosités grossières.

Pilosité dressée brunâtre espacée sur le corps, nulle sur les tibias et les tarsi. Pubescence roussâtre abondante sur les membres, plus espacée sur le corps.

Noir. Antennes et pattes brun foncé. Mandibules et tarsi brunâtres. Ailes teintées de brunâtre, mais encore transparentes. À la base des segments abdominaux un léger reflet métallique peu apparent.

Hab. COSTA RICA^{2 4} (*Pittier*) [♂ ♂], Alajuela (*Alfaro*³).—COLOMBIE^{2 4}.

2. *Pachycondyla flavicornis*.

Formica flavicornis, Fabr. Ent. Syst., Suppl. p. 280 (♂) (1789)¹; Latr. Hist. nat. des Fourmis, p. 202, t. 7. figg. 42 B (♀ ?), 43 (♂) (1802)².

Ponera flavicornis, Lepel. Hist. Nat. Ins. Hymén. i. p. 190 (♂ ♀) (1836)³; Smith, Cat. Hymen. vi. p. 95⁴.

Pachycondyla flavicornis, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xiii. p. 439⁵; Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. 1890, pp. 58, 73⁶; Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 42 (1890)⁷; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 33⁸.

Hab. GUATÉMALA⁶, El Reposo (*Champion*); COSTA RICA⁶, Alajuela, Jiménez