

(*Alfaro*<sup>1</sup>); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♂].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Colombie<sup>8</sup>, Guyane<sup>8</sup>, Brésil<sup>7</sup>, Pérou<sup>6</sup>.

Commune dans la forêt vierge de Colombie, courant surtout par terre (*Forel*).

Var. *obscuricornis*.

*Pachycondyla flavicornis* (Fabr.), var. *obscuricornis*, Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. 1890, pp. 58, 73 (♀)<sup>9</sup>; Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 42 (1890)<sup>10</sup>.

*Hab.* COSTA RICA<sup>9</sup>, Alajuela (*Alfaro*<sup>10</sup>).—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Pará<sup>1</sup>.

### 3. *Pachycondyla apicalis*.

*Formica apicalis*, Latr. Hist. nat. des Fourmis, p. 204, t. 7. fig. 42 A (♂) (1802)<sup>1</sup>.

*Ponera (Myrmecia) apicalis*, Latr. Gen. Crust. et Ins. iv. p. 128<sup>2</sup>.

*Ponera apicalis*, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 97<sup>3</sup>.

*Pachycondyla apicalis*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xiii. p. 439<sup>4</sup>; Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 73 (♂)<sup>5</sup>; Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 42 (1890)<sup>6</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 32<sup>7</sup>.

*Hab.* COSTA RICA<sup>7</sup> (*Tonduz*) [♂ ♀], Alajuela, Pozo Azul, Juan Viñas (*Alfaro*<sup>6</sup>); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♂].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE<sup>3</sup>, Guyane<sup>6</sup>, Brésil<sup>3</sup>.

Commune dans la forêt vierge de Colombie, courant surtout par terre (*Forel*).

### 4. *Pachycondyla carinulata*.

*Ponera carinulata*, Roger, Berl. ent. Zeitschr. v. p. 4 (♀) (1861)<sup>1</sup>.

*Pachycondyla carinulata*, Mayr, Sitzungsab. Akad. Wiss. Wien, lxi. p. 397<sup>2</sup>; Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 73 (♂)<sup>3</sup>.

*Hab.* AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Guyane<sup>2</sup>, Brésil<sup>1 3</sup>.

Race *azteca*, n.

♂. Long. 7 millim. L'abdomen n'est pas tronqué, mais arrondi devant. Le nœud du pédicule est beaucoup plus haut derrière que devant. Sa face supérieure est fortement déclive d'arrière en avant. Sa face postérieure est convexe et presque deux fois plus haute que la face antérieure; cette dernière est plane. Abdomen plutôt court, peu échancré après le 1<sup>er</sup> segment. Tête tronquée derrière. Correspond du reste à la description de Roger. L'espèce typique est de Cayenne.

*Hab.* PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♂].

### 5. *Pachycondyla fœtida*.

*Formica fœtida* (? Linn.), Oliv. Encycl. Méthod., Ins. vi. p. 502 (1791)<sup>1</sup>; Latr. Hist. nat. des Fourmis, p. 206 (♀) (1802)<sup>2</sup>.

*Ponera fœtida*, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 95 (1858)<sup>3</sup>; Roger, Berl. ent. Zeitschr. 1860, p. 312 (♀)<sup>4</sup>.

*Pachycondyla fœtida*, Roger, Verz. Formicid. p. 18 (1863)<sup>5</sup>; Emery, Ann. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 74 (♂)<sup>6</sup>; Bull. Soc. Ent. Ital. xxii. p. 43 (1890)<sup>7</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 33<sup>8</sup>.

*Hab.* COSTA RICA<sup>6 8</sup>, Alajuela, Jiménez (*Alfaro*<sup>7</sup>); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♂ ♀].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE<sup>3</sup>, Guyane<sup>4 6</sup>.