

angustiore; 4°–8° globulosis, secundo parum longioribus; reliquis obconicis, sensim crescentibus, sed semper parvis et vix angustioribus. Pronotum capiti longitudine æquale, latius quam longius, fere quadratum, angulis præsertim posticis rotundatis. Elytra lateribus rectis; alarumque squamæ perfectæ. Pedes breves, femoribus crassis, tibiis tarsisque gracilibus; tarsorum articulo 1° tertii longitudinem æquante, sed illo crassiore, 2° brevissimo, cylindrico, apice leviter bifido. Abdomen: ♀ lateribus fere parallelis; ultimo dorsali segmento subrectangulari, latiore quam longiore; penultimo ventrali segmento multo latiore quam longiore, dimidia parte basali obtuse triangulari, apice ovato-producto; ultimi segmenti medio longitudinaliter fissi fere dimidia parte patente. Forcipis crura subcontigua, sat brevia, crassa, triquetra, subrecta, apice ipso curvato, ut in genere *Psali* constructa.

(Mares ignoti.)

Ce genre nouveau, dont je n'ai vu que deux femelles, l'une du Nicaragua, l'autre du Pérou, est tout voisin du genre *Pyragra*; il s'en distingue par: la tête plus bombée et plus étroite; le pronotum non rétréci antérieurement, plus court, moins arrondi; les pattes plus courtes, sans pelotes visibles entre les griffes, et la forme de la pince.

Il diffère du genre *Echinosoma* par la forme de tout l'abdomen, du dernier segment dorsal, du pénultième segment ventral, et de la pince.

En résumé, les insectes de ce genre ont la moitié antérieure du corps—tête, pronotum, élytres, ailes et pattes—du genre *Echinosoma*, et la moitié postérieure—abdomen et pince—du genre *Psalis*.

(Nous nous sommes assuré, il est presque inutile de le dire, que nos exemplaires ne sont point artificiels, c'est à dire dus à la réunion maladroite de deux moitiés d'insectes divers. Ce cas ne se présente que trop fréquemment lorsque des amateurs inexpérimentés veulent réparer les ruptures causées par les chocs dans de longs voyages.)

1. *Echinopsalis guttata*, sp. n. (Tab. I. fig. 4, ♀.)

Longit. corp. 14 millim.; forcip. 3 millim.

♀. Caput nigrum, clypeo testaceo; antennæ saltem 22-articulatæ, fuscae, art. 2° et 3° testaceis exceptis. Pronotum nigro-fuscum, lateribus et parte postica late albo-flavo marginatis. Elytra nigro-fusca, macula magna triangulari albo-flava longitudinaliter a basi usque ad medium ornata. Alarum media pars interna fusco-nigra, media pars externa flava. Femorum pars media basalis fusco-nigra, pars apicalis albo-testacea; tibiæ tarsique albo-testacei. Caput, pronotum, elytra, alæ, pedesque pilis fuscis hirsuta. Abdomen fere glabrum, castaneum, ultimo dorsali segmento fere quadrato. Forcipis crura ut in genere *Psali* formata, inæqualia (dextro longiore), castanea, robusta, margine interno denticulato.

Hab. NICARAGUA, Chontales (Janson).

PYRAGRA.

Pyragra, Serville, Ann. Sc. Nat. xxii. p. 34 (1831).

Thermastris, Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxiv. p. 61 (1863).

1. *Pyragra saussurei*.

Pygidierana Saussurei, Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxiii. p. 225, t. 1. fig. 2 (1862)¹.

Hab. MEXIQUE, Cordova (*Saussure*¹), Atoyac (*Schumann*); HONDURAS BRITANNIQUE, R. Sarstoon (*Blancaneaux*); GUATÉMALA, Zapote, Capetillo (*Champion*), Vera Paz (*Conradt*); COSTA RICA, Caché (*Rogers*). [♂ ♀.]