

2. *Pyragra chontalia*.

Thermastris chontalia, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xviii. p. 258 (1876)¹.

Hab. GUATÉMALA, Chiacam en Vera Paz (*Champion*); NICARAGUA, Chontales¹.

[Sexe? (individu privé de pincés).]

PSALIS.

Psalis, Serville, Ann. Sc. Nat. xxii. p. 34 (1831).

1. *Psalis americana*.

Forficula americana, Palisot de Beauvois, Ins. Afr. et Amér. p. 165, Orth. t. 14. fig. 1 (1817)¹.

Labidura americana, Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxiv. p. 319 (1863)².

Hab. NICARAGUA, Chontales (*Janson*); COSTA RICA². [♀.]—COLOMBIE²; VENEZUELA²; ANTILLES, Cuba², San Domingo¹, Haiti².

2. *Psalis gagatina*. (Tab. I. figg. 5, ♂; 6, ♀.)

Forficula (Psalis) gagathina (Klug, MS.), Burm. Handbuch der Ent. ii. p. 753 (1838)¹.

Labidura gagatina, Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxiv. p. 320 (1863)².

Hab. PANAMA, Bugaba (*Champion*). [♂ ♀.]—ANTILLES, Porto Rico^{1 2}.

3. *Psalis thoracica*. (Tab. I. fig. 7, ♀.)

Forficesila thoracica, Serville, Orthoptères, p. 22 (1839)¹.

Hab. PANAMA, Bugaba 800 à 1500' (*Champion*). [♀.]—GUIANE, Cayenne¹.

CARCINOPHORA.

Carcinophora, Scudder, Entom. Notes, v. p. 31 (1876); Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xviii. p. 291 (1875-1876).

Ce genre, très éloigné du genre *Chelidura*, Latreille, par le nombre et la forme des articles antennaires et la construction du 2^e article tarsal, est au contraire compris entre les genres *Psalis* et *Anisolabis*; il diffère presque uniquement du 1^r par l'absence d'ailes, et du 2^e par l'existence d'élytres bien formées.

1. *Carcinophora robusta*.

Chelidura robusta, Scudder, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xii. p. 344 (1869)¹; Entom. Notes, ii. p. 29 (1869)².

Psalis colombiana, de Bormans, Étude sur quelques Forficulaires, Ann. Soc. Ent. Belg. xxvii. p. 61, t. 2. figg. 2, 2 a, 2 b (1883)³.

Hab. COSTA RICA, Caché (*Rogers*). [♂.]—COLOMBIE³; ÉQUATEUR, entre Quito et Napo^{1 2}.