

ANISOLABIS.

Anisolabis, Fieber, Lotos, iii. p. 257 (1853).

1. **Anisolabis janeirensis.** (Tab. I. figg. 8, ♂; 9, ♀.)

Forcinella janeirensis, Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxv. p. 285 (1864)¹.

Hab. NICARAGUA, Chontales (*Janson*). [♂ ♀.]—BRÉSIL, Rio Janeiro¹.

2. **Anisolabis annulipes.**

Forficesila annulipes, Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr., Bull. p. lxxxiv (1847)¹.

Forficula (Labidura) annulipes, Fisch. Orthopt. Eur. p. 69, t. 6. figg. 6, a-c (1853)².

Hab. MEXIQUE, Valle del Maiz (*Dr. Palmer*); NICARAGUA, Chontales (*Janson*). [♂ ♀.]
—EUROPE MÉRIDIONALE².

3. **Anisolabis azteca.**

Forcinella azteca, Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxiii. p. 226 (1862)¹, et xxv. p. 291 (1864)².

Hab. MEXIQUE (*Saussure*¹), Monclova en Coahuila et San Luis Potosi (*Dr. Palmer*).
[♂ ♀.]

Ne diffère pas beaucoup de l'espèce précédente.

4. **Anisolabis antoni.** (Tab. I. fig. 10, ♀.)

Forcinella antoni, Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxv. p. 289 (1864)¹.

Hab. MEXIQUE, San Luis Potosi (*Dr. Palmer*); GUATÉMALA, Capetillo (*Champion*);
NICARAGUA, Chontales (*Janson*). [♀.]—VENEZUELA¹.

5. **Anisolabis maritima.**

Forficula maritima (Bonelli, MS.), Gené, Monogr. Forf. p. 9 (1832)¹.

Forficula (Labidura) maritima, Fisch. Orthopt. Europ. p. 68, t. 6. figg. 4, 4 a-d (1853)².

Hab. NICARAGUA, Chontales (*Janson*); COSTA RICA, Caché (*Rogers*); PANAMA, Volcan de Chiriqui 2500 à 4000' (*Champion*). [♂ ♀.]—EUROPE MÉRIDIONALE¹.

SPARATTA.

Sparatta, Serville, Orthoptères, p. 51 (1839).

1. **Sparatta nigrina.** (Tab. I. figg. 11, ♂; 12, ♀.)

Sparatta nigrina, Stål, Öfv. Vet.-Akad. Förh. xii. p. 350 (1855)¹; Dohrn, Stett. ent. Zeit. xxvi.
p. 70 (1865)².

Hab. GUATÉMALA, Chinautla (*Salvin*), Volcan de Fuego 6400', Sabo en Vera Paz (*Champion*); NICARAGUA, Chontales (*Janson*). [♂ ♀.]—BRÉSIL, Rio Janeiro^{1 2}.