

Subfam. *PHASMINÆ.**Conspectus generum.*

1. Femora 4 postica carina infera mediana nulla vel obtusa, inermi.
2. Femora teretia vel leviter carinata. Ocelli semper adsunt. (Sect. *STRATOCLES.*)
  3. Femora antica basi recta, superne teretia, haud vel indistincte carinulata.
    4. Occiput fortiter globoso-tumidum . . . . . EUCLES, Redt.
    - 4'. Occiput haud globoso-tumidum . . . . . STRATOCLES, Stål.
  - 3'. Femora antica basi distincte incurva.
    4. Femora antica carina supera interna nulla vel haud elevata, subtus carina mediana nulla vel obtusissima.
    5. Tibiae omnes superne subtusque teretes.
      6. Mesonotum haud sulcatum. Statura major, robustior . OLCYPHIDES, Griff.
      - 6'. Mesonotum sulcatum. Statura minor, tenerrima . . . TENERELLA, Redt.
    - 5'. Tibiae anticæ superne sulcatæ vel bicarinulatae.
      6. Femora postica teretia vel subtilissime bicarinulata . . . AGROSTIA, Redt.
      - 6'. Femora postica distincte sulcata vel bicarinata.
        7. Tibiae posticæ superne bicarinulatae vel sulcatæ . . . BRIZOIDES, Redt.
        - 7'. Tibiae posticæ superne teretes . . . . . HOLCA, Redt.
    - 4'. Femora antica carina supera interna (præcipue in ♀) distincte elevata, subtus carina mediana acuta instructa . . . . . CHLOROPHASMA, Redt.
  - 2'. Femora antica saltem oblique compressa, acute et distincte carinata. Ocelli nulli. (Sect. *PRISOPA.*)
    3. Occiput globosum, lœve vel bispinosum . . . . . DAMASIPPUS, Stål.
    - 3'. Occiput haud globosum, cum thorace granulatum et tuberculatum. PRISOPUS, Serv.
  - 1'. Femora 4 postica carina infera mediana distincta, inermi vel obtusiore et spinulosa.
    2. Elytra alæque nulla. Femora triquetra. (Sect. *DONUSA.*) . . . DONUSA, Stål.
    - 2'. Elytra alæque plerumque explicatæ. Femora 4 postica saltem carinis superis distincte remotis.
      3. Elytra brevia, rotundato-ovata. Femora antica haud vel parum compressa. Ocelli adsunt. (Sect. *PHASMATA.*)
      4. Occiput planiusculum.
        5. Femora 4 postica simplicia . . . . . PHASMA, Serv.
        - 5'. Femora 4 postica apice clavata . . . . . PSEUDOPHASMA, Bol.
      - 4'. Occiput gibbosum, bicornis . . . . . [EUPHASMA, Redt.]
    - 3'. Elytra longiora, lanceolata. Femora antica præcipue basin versus distincte compressa. Ocelli variabiles. (Sect. *PRAEXASPES.*)
    4. Occiput haud auritum.
      5. Elytra alæque perfectæ explicatæ vel abbreviatæ.
      6. Mesonotum gracile, teres, carinis lateralibus nullis.
      7. Alæ abbreviatæ . . . . . PLANUDES, Stål.