

- 7'. Alæ elongatæ.
 8. Tuberculum elytrorum distinctum, compressum, rotundatum vel undulatum ISAGORAS, Stål.
 8'. Tuberculum elytrorum obsoletum vel nullum PERLIODES, Redt.
 6'. Mesonotum brevius et latius, depressum, carinis lateralibus distinctis.
 7. Elytra tuberculo obsoleto vel nullo. Pronotum postice spinis recurvis nullis METRIOTES, Westw.
 7'. Elytra tuberculo obtuso sed distincto. Pronotum rite spinis 2 recurvis validis instructum XEROSOMA, Serv.
 5'. Elytra alæque desunt [XERA, Redt.]
 4'. Occiput cristis 2 elevatis, spinosis, auriformibus [CREOXYLUS, Serv.]

DONUSA, Stål.

Donusa, Stål, Rec. Orth. iii. pp. 54, 94 (1875); Redtenbacher, op. cit. i. p. 98.

1. *Donusa prolixa*, Stål.

Donusa prolixa, Stål, Bih. Svensk. Akad. iii. (17) p. 16 (1875); op. cit. iii. p. 54 (1875); Redtenbacher, op. cit. i. p. 99, t. 4. fig. 11 (1906).

Hab. MEXICO, Tampico, Jalapa (*Mus. Hamburg; coll. Bolivar*).—BRAZIL; CHILI.

EUCLES, Redt.

Eucles, Redtenbacher, op. cit. i. p. 101 (1907).

Conspectus specierum.

1. Pedes toti nigri *E. bifasciatus*, Redt.
 1'. Pedes nigri, flavo-annulati [*E. imperialis*, Redt.]

1. *Eucles bifasciatus*, Redt.

Eucles bifasciatus, Redtenbacher, op. cit. i. p. 102 (1906).

Hab. COSTA RICA (*Mus. Geneva*).

[2. *Eucles imperialis*, Redt. (Tab. VIII. figg. 3 *a, b*, ♀; 3 *c*, ♂.)

Eucles imperialis, Redtenbacher, op. cit. i. p. 101 (1906).

Hab. COLOMBIA; PERU.]